



Под этим понимают эндоскопию пищевода, желудка и верхней части тонкого кишечника.

Когда проводится это исследование? В ходе этого исследования могут анализироваться жалобы по поводу верхней части пищеварительного тракта. При этом речь может идти о затрудненном глотании, болях за грудиной, кислой отрыжке, ощущении переполнения, тошноте, непонятной рвоте, вплоть до появления кровавой рвоты и черного цвета дефекации. Посредством диагностики верхней части желудочно-кишечного тракта могут быть прояснены также хронические дефицитные состояния, такие, как нехватка железа или дефицит витаминов.

Как протекает гастроскопия?

Накануне исследования мы проводим разъясняющую беседу, в ходе которой мы даем разъяснения относительно самого обследования и обсуждаем Ваши индивидуальные пожелания и факторы риска. Непосредственно в день проведения исследования нельзя больше принимать внутрь твердую или жидкую пищу. Гастроскопия может, в зависимости от Вашего желания, производиться в состоянии дремоты или же только с легкой анестезией глотки. Эндоскоп вводится через ротовое отверстие и продвигается вплоть до достижения двенадцатиперстной кишки. Путем вдвухания воздуха в пищеварительный тракт желудок расширяется и это делает возможным произвести точную оценку слизистой оболочки. В зависимости от поставленных вопросов и получаемых заключений может производиться забор проб, удаление полипов, посредством высокой температуры могут склерозироваться сосуды (аргон-плазменная коагуляция) и производиться лечение крупных язв. Гастроскопия верхнего пищеварительного тракта продолжается ок. 10-15 минут, а если требуются меры по лечению и обработке, то исследование может продолжаться и дольше. Во время наркозной дремоты Вы находитесь под нашим постоянным контролем. После просыпания Вы в очень короткие сроки снова чувствуете себя бодрыми. Тем не менее, Ваша способность реагирования в течение некоторого времени может Вас подводить. Поэтому, в частности, на протяжении последующих 24 часов, Вам не следует садиться за руль автомобиля. Пожалуйста - позаботьтесь накануне исследования о том, чтобы Вас из нашей практики мог забрать человек, которому Вы доверяете, а в день исследования, по возможности, не оставайтесь дома одни.